

КАРТОФЕЛЬ черри 1шт 1445100272
КАРТОФЕЛЬ Беби 2кг (цена за кг) 1000429798



Дата ввода:
29.09.2023

Допустимый % некалибра 5%
Наличие земли Не допускается

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	мешок - сетка/гофрокороб		
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	Экструзионная сетка-домик с брендовой лентой/перфорированный полиэтиленовый пакет премиум с фиксированным весом		
ВЕС 1 ШТ	КАРТОФЕЛЬ черри 1кг	1 кг	
	КАРТОФЕЛЬ Беби 2кг (цена за кг)	2 кг	

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ				
	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	сетка-мешок/гофрокороб	-	-	-
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона)		РАЗМЕРЫ, мм	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА
	15кг		800 x 1200	1,6м
ОПАЛЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припаллечиванием к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка должна проводиться «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха. Между поддоном и товаром должна располагаться проложка для исключения повреждения сеток.			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Необходимая температура транспортировки "Эталон"	От +0°С до +10°С
ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	От +0°С до +10°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-0,6°С
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА	Выделение этилена низкое, чувствительность к нему средняя.


КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
КАЛИБР	Калибр измеряется квадратным калибратором, методом грохочения.	
	калибр	Дополнительные требования по калибру
КАРТОФЕЛЬ черри 1кг	от 20 мм до 35 мм	- к некалибру относим более 35 мм
КАРТОФЕЛЬ Беби 2кг (цена за кг)	от 30 мм до 40 мм	- к некалибру относим менее 30 мм - к некалибру относим более 40 мм
СОРТА	Допускается только мытый картофель красных, белых, желтых сортов со сформированной кожурой	
ФАСОВКА	4 потребительские упаковки в сетке/гофрокоробе	
ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	Содержимое партии должно быть однородным и состоять только из картофеля одного и того же происхождения, разновидности, качества, окраски кожуры, окраски внутренней части клубней	

Требуемое качество картофеля
Клубни картофеля должны быть свежими, целыми, чистыми, здоровыми, плотными, мытыми, типичной для ботанического сорта формы, не повреждённые с/х вредителями, без чрезмерной поверхностной влажности, без какого-либо постороннего запаха.








К браку относится вся потребительская упаковка, если в ней есть 3 и более клубней с дефектом относящимся к браку. Во всех остальных случаях дефект определяем весом.


Допустимые отклонения для 1 категории			
Лёгкий дефект формы	Шероховатость и бугристость менее 5 мм	Ростовые трещины глубиной менее 5 мм	Регионовые кольца без потемнения мякоти
			

Допустимые отклонения для 2 категории				
Порезы и свежие трещины не более 3 мм в глубину	Вмятины (примятость, придавленность) без потемнения мякоти	Физиологическое потемнение кожуры (серое или коричневое) менее 1/4 площади клубня удаляемое обычной чисткой	Парша менее 1/4 площади, менее 2мм в глубину	
				

Нестандарт				
Не целый клубень, механическое повреждение глубиной более 5 мм и длинной более 10 мм.	Нетвердый, слегка увядший клубень с легкой морщинистостью, не более 1/4 поверхности	Парша более 1/4 площади, менее 2 мм в глубину	Физиологическое потемнение кожуры (серое или коричневое) без гнили, более 1/4 площади клубня	
				

Ростовые трещины глубиной более 5 мм	Позеленение на площади менее 1 см2, удаляющееся обычной чисткой	Внутренние пустоты, без загнива/плесени/болезни	Сетчатость кожуры. На поверхности клубня образуются мелкие трещины или сетка из неглубоких трещин, затрагивающих только пробковую кожуру и примыкающие к ней ткани. Мякоть доброкачественная.	
				
Уродство				
				


Брак				
Порошистая парша глубже 2 мм		Сухая фузариозная гниль	Пуговичная фомозная гниль	
				
Чёрное сердечко	Закрахмалившееся механическое повреждение глубже 5 мм	Кольцевая бактериальная гниль	Антракноз	Альтернариоз
				
Мокрая бактериальная гниль	Сухая фомозная гниль	Повреждение картофельной молью	Повреждение с/х вредителями на глубину более 5 мм.	
				
Серые и ржавые пятна под кожей глубиной и шириной более 5 мм		Стекловидность	Позеленение на площади более 1 см2, а так же менее 1 см2, но не удаляющееся обычной чисткой	Внутренние пустоты с загнивом
				

Повреждение проволоочником (более двух ходов)	Запеченная	Сетчатая пятнистость (сетчатый некроз клубня)	Проросший картофель	
				
Повреждение морозом	Фитофтороз	Загрязненный клубень	Вирусный некроз	Реглоновые кольца с потемнением мякоти
				
Остатки хим. обработки	Сухая гниль	Порезы и свежие трещины, затрагивающие мякоть	Ушибы	Остатки гнилых масс
				

Основные инфекционные заболевания и физиологические дефекты

	При нарушении условий хранения, особенно во влажных условиях, клубни вторично поражаются мокрыми гнилями, что несёт большую опасность. Переборка эффективна Критическая температура $>10,0^{\circ}\text{C}$
---	--

Фитофтороз

	Болезнь быстро прогрессирует, особенно при нарушении температурного режима, и может распространяться на соседние клубни. Переборка достаточно эффективна, но партию с содержанием заболевания более 4% не следует хранить более 5 дней. Критическая температура $>10,0^{\circ}\text{C}$
--	---


Сухая фузариозная гниль

	Повторные перезаражения при хранении происходят редко. Переборка достаточно эффективна, но партию с содержанием заболевания более 4% не следует хранить более 5 дней. Критическая температура $>10,0^{\circ}\text{C}$
--	---

Пуговичная фомознаягниль

	Имеет характерный не приятный запах. Болезнь очень быстро прогрессирует. При хранении, происходит перезаражение соседних клубней. В случае диффузного распространения необходима немедленная реализация. Однако очаги заболевания при их обнаружении, рекомендуется удалять. Заболевания часто можно увидеть на плохо просушенном, влажном картофеле с мех. повреждениями. Если процент поражения менее 25, то необходима немедленная (1день) переборка и срочная реализация не позднее 2 дней. Если процент поражения более 25 то переборка, скорее всего эффекта не даст. С содержанием заболевания более 4% не следует хранить более 5 дней. Критическая температура $>7,0^{\circ}\text{C}$
--	--

Мокрая бактериальная гниль



Заболевание очень опасно при хранении – быстро прогрессирует, возможно перезаражение. Отличительным признаком бактериальной гнили является выступление слизи на разрезе из пораженных участков, при сдавливании клубня. Нужна срочная (1-2 дня) переборка и реализация в течении 2-х дней.
Критичная температура >7,0°C

Кольцевая бактериальная гниль



Перезаражение при хранении почти не происходит. Снижению развития способствует соблюдение температурного режима хранения. Переборка достаточно эффективна. Критичная температура >10,0°C

Антракноз



Перезаражение маловероятно, однако больные клубни часто поражаются сухой гнилью. Переборка достаточно эффективна.
Критичная температура >10,0°C

Альтернариоз



Во время хранения презаражение не происходит. Переборка эффективна.
Критичная температура >25,0°C

Чёрная парша



Во время хранения презаражение не происходит. Переборка эффективна.
Критичная температура >25,0°C

Обыкновенная парша




Во время хранения презаражение не происходит. Переборка эффективна.
Критичная температура >25,0°C

Порошистая парша



Перезаражения во время хранения не происходит, признаки заболевания на поражённых клубнях появляются через 1-2 месяца после уборки и прогрессируют в процессе хранения. Переборка эффективна.
Критичная температура >25,0°C

Бугорчатая парша



При нарушении режимов хранения, возможно перезаражение. Переборка эффективна.
Критичная температура >25,0°C

Серебристая парша



Основная причина – недостаток фосфора в почве. Во время хранения не развивается. Без внешнего проявления переборка невозможна.
Критичная температура >15,0°C

Железистая ржавая пятнистость




Физиологическое расстройство из-за нарушения минерального питания, воздействия высоких температур, ушибов. Суть потемнения – образование меланина. В зависимости от вида неблагоприятного фактора различается локализация потемнения мякоти. Во время хранения не развивается. Без внешнего проявления переборка невозможна.
Критичная температура >15,0°C

Потемнение мякоти



Клубни повреждают в основном личинки различных жуков и бабочек. Их развитие в условиях хранения замедленно. Часто такие клубни загнивают. Переборка эффективна
Критичная температура >15,0°C

Повреждения вредителями



Повреждение картофельной молью. Карантинный объект. Реализация и перевозка картофеля повреждённого картофельной молью запрещена.
Критичная температура >15,0°C

Повреждение Картофельной молью




Такие клубни быстро поражаются мокрыми гнилями, что способствует ещё большему ухудшению качества партии. Если партия была заморожена не полностью, то необходимо отделить испорченную продукцию от доброкачественной.

Подмораживание



На поврежденных клубнях увеличиваются в размере чечевички, они приобретают вид белых рыхлых бугорков. В нормальных условиях хранения картофеля бугорки постепенно исчезают и на их месте остаются небольшие пятнышки. При нарушении же режима хранения уже через месяц может начаться массовая гниль клубней от удушения. Мякоть их становится рыхлой, кашицеобразной и издает неприятный спиртовой запах. На воздухе разложившаяся ткань буреет медленно, что отличает их от подмораживания. Клубни поражаются мокрой гнилью. Партии картофеля с признаками почвенного удушения следует реализовывать в первую очередь.

Удушье



Зачастую поражённый клубень выглядит совершенно нормально и застуженность можно опознать только по сладковатому вкусу. Наличие сладковатого вкуса можно преодолеть постепенным повышением температуры до 8-10°C. Без внешнего проявления переборка невозможна.

Застуженность