

КУКУРУЗА в початках 1шт 1445100106



Дата ввода:
07.05.2022

Допустимый процент некалибра: 5%

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА: картонные коробки (пятыслойный гофрокартон), пластиковые ящики + требование защитных материалов, сетка

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона) 15кг		РАЗМЕРЫ, мм 800 x 1200	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА 1,6м
ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припалечиванием к самому поддону, для исключения заваливания товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка должна выглядеть «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха.			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


НЕОБХОДИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ "Эталон"	От +2°C до +5°C
ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	от +2°C до +5°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-0,5°C

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛИБР	В длину 18+ см
ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежих плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета
ЦВЕТНОСТЬ	согласно сорта кукурузы

Качество

Початки кукурузы должны быть неповрежденными, доброкачественными, свежими на вид, чистыми. Верхушка початка с недоразвитыми зернами должна быть срезана. Зерна должны плотно смыкаться друг с другом, быть сочными, иметь нежную оболочку. Допускаются вмятинки на зернах при сохранении сочности, початки с неровными рядами зерен. Конденсат на початках кукурузы, вызванный разницей температур, не считают излишней внешней влажностью.

Верхняя часть початка с недоразвитыми зернами длиной ≤3см	Зерна должны быть сочными, иметь нежную оболочку	Початки с неровными рядами зерен	Плодоножка длиной ≤ 4см
			

Единичные зерна кукурузы, отличные по цвету



Нестандарт


Зернами, поврежденными вредителями ≤ 4 зерен (на расстоянии > 3см от верхушки початка); Признаки подморозки на листьях; Плодоножка длиной > 4см, Оголенные початки

початок с упругими/твердыми зернами.	Верхняя часть початка с недоразвитыми зернами длиной > 3см	Початок с желтыми и увядшими листьями без загнива		Отсутствие зерен на початке ≤ 4шт (на расстоянии > 3см от верхушки початка)
				

Загрязнение	Плодоножка длиной более 4 см	Полностью оголенный кочан (отсутствие листьев)		
				

Брак

В отход относятся початки с наличием загнивших зерен от 1 зерна. Также к отходу относят початки с наличием более 4-х зерен, имеющих такие дефекты как: повреждения вредителями, початки с грубыми механическими повреждениями, початки с механическими дефектами, початки с прочими дефектами, делающими их непригодными к употреблению или початки, не соответствующие ботаническому сорту, початки с зернами грубыми, сморщенными, а также початки со значительной потертойостью зерен. Зерна не должны быть сморщенными, поврежденными болезнями или вредителями.

Фузариоз початков	Красная гниль	Аспергиллез	Плесень / Пенициллез	Диплодиоз
				

Нигроспориоз	Пузырчатая головня	Пыльная головня	Зернами, поврежденными вредителями > 4 зерен (на расстоянии > 3см от верхушки початка)	Повреждения вредителями
				

Отсутствие зерен на початке > 4шт (на расстоянии > 3см от верхушки початка)	Розовая гниль	Загнив зерна	Сморщенные, сухие зерна	Наличие живых насекомых
				

Сорта

Зубовидная	Сахарная (овощная)
	