

1444000063 Питайхайя цена за кг
1000418564 Питайхайя желтая (вес)
1000418565 Питайхайя красная мякоть (вес)



Дата ввода:
22.10.2024

Допустимый процент некалибра: 10%


БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картонные коробки, навал + требование защитных материалов			
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	плод должен быть упакован в индивидуальный прозрачный пакет			
СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ				
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона)		РАЗМЕРЫ, мм	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА
	15кг		800 x 1200	2м
ОПАЛЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припаллечиванием к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 2м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка долна вестить «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха.			
ФАСОВКА	4-5 кг			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
НЕОБХОДИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ "Эталон"	от +3°С до +8°С
ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	от +3°С до +8°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-1°С
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА	----

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КАЛИБР	350 гр+
ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежих плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета

Требуемое качество

Питайхайя является кактусовым растением, её плоды имеют овальную или яйцевидную форму. Мякоть белая, сероватая, серо-голубая, темно-розовая желеобразная, содержит большое количество мелких съедобных семян черного цвета. Вкус освежающий, кисло-сладкий. Цвет кожицы (от желтого до оранжевого, от красного до пурпурного). Плоды должны быть целыми, свежими на вид, без механических повреждений, с удаленными колючками, доброкачественными, без нажимов.



Допустимые отклонения для 1 категории

Пигментация в плодоножке	Потемнение области крепления плода, пыль, одеревенение и сухие органические частицы в султанке , небольшое увядание султанки без наличия плесени	Легкие дефекты кожицы, зарубцевавшиеся механические повреждения кожицы не затрагивающие мякоть, общая площадь которых не превышает 2 см²

Заломы стебля на султানে. Усыхание листьев султаны		Незначительный дефект формы
		

Наличие коричневой "одревенелой зоны" на срезе между мякотью и султаном при светлой коже (без признаков разложения мякоти)			Отличие по цветности плода
			

Допустимые отклонения для 2 категории


Обрезанные листья султаны	Сморщенность плода без загнива и без увядания лепестков на плоде (не на султানে)	
		

Зарубцевавшиеся ломы лепестков на плоде (более 3-х)	
	

Нестандарт

Незначительное наличие плесени в полости султаны, которая не затрагивает внешние полости султаны, без загнива и проникновения в мякоть плода	Дефекты кожицы, такие как ушибы, царапины и другие зарубцевавшиеся механические повреждения кожицы, не затрагивающие мякоть, общая площадь которых более 2 см²
	

Наличие заплесневевшего пестика без плесени на стенках султаны (ороговения допускаются)		Загнив отростков (лепестков) на плоде (не на султানে) без наличия плесени
		

Брак		
Наличие колючек	Перезревший (с побурением мякоти) плод	Увядавшие, сморщенные плоды с желтыми лепестками
		
Темная кожура в разрезе между мякотью и султаном с разложением мякоти		
		
Грубые механические повреждения плода, плоды с трещинами, проколами, раздавленные	Наличие насекомых-вредителей, а также продуктов их жизнедеятельности	Замороженные и застуженные плоды
		
Ломаные листья на плоде с наличием плесени и потемнения	Внешнее (визуальное) явное наличие плесени на султане (не внутри) с присутствием плесени на листьях самой султаны	Наличие плесени на срезе
		
Загнившие плоды, плоды пораженные плесенью		
		
Основные инфекционные заболевания и физиологические дефекты		
Внешний вид заболевания	Описание	
	Вызывается грибами рода <i>Aspergillus</i> . Внутри плодов образуется обильный черный спороносящий налет, имеющий неприятный запах плесени. Возбудитель проникает через поврежденные поры («глазки»). Поврежденные глазки при этом покрываются плесенью. Перезаражение во время хранения возможно при наличии механических повреждений глазков соседних здоровых плодов. Переборка неэффективна из-за скрытого характера дефекта. Критическая температура > 5 оС.	
	Аспергиллез	
	Пораженные плоды имеют гниющую, разлагающуюся по периферии мякоть. Заболевание вызывается грибами <i>Seratiocystis paradoxa</i> , <i>Lasiodiplodia</i> (<i>Botrydiplodia</i>) <i>theobromae</i> . Во время хранения перезаражение не происходит. Переборка неэффективна, так как дефект имеет скрытый характер и может проявиться внезапно во время хранения. Критическая температура > 8 оС	
	Базальная гниль	

	Обычно поражаются ослабленные или повреждённые яблоки. Возможно перезаражение при хранении в т.ч. с другими культурами. Переборка относительно эффективна. Партия требует переборки (в течении 2-3 дней) и реализации после неё в течении не более 3 дней. Критичная температура >5,0°C
Чёрная гниль (Альтернариоз и Стемфилиоз)	