


СЕЛЬДЕРЕЙ стебель 1шт 3412080025



Дата ввода:
13.04.2022

Допустимый процент некалибра:	10%
-------------------------------	-----

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картон трехслойный, пятислойный, пластиковый ящик			
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	перфорированный полиэтиленовый пакет			
СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ				
	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картон трехслойный, пятислойный, пластик			требование защитных материалов
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	полиэтилен			
ПАЛЛЕТЫ	ТИП (минимальная масса поддона)		РАЗМЕРЫ, мм	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА
	15кг		800 x 1200, 1000x1200	1,6-2м
ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в три слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припалечиванием к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м, включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опаллетка должна вестись «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха.			
ФАСОВКА	8шт. в упаковке			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
НЕОБХОДИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ "ЭТАЛОН"	от +2°С до +6°С
ВНУТРИПОДОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	от +2°С до +6°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-0,5 °С
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА	очень низкое

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КАЛИБР	индивидуальная упаковка с весом 400 гр +
ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежих плодов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета
ЦВЕТНОСТЬ	У самоотбеливающегося типа сельдерея окраска черешков должна быть белой, желтовато-белой или зеленовато-белой, по меньшей мере на ¼ их длины. У зеленого сельдерея – цвет черешков от светло-зеленого по всей длине.

Требуемое качество

Сельдерей должен быть чистым, свежим на вид, хрустящим, не волокнистым, без повреждений морозом, без полостей, корневых или цветочных побегов, без поврежденных насекомыми вредителями и присутствием живых. Основной корень должен быть тщательно очищен, а его длина не должна превышать 5 см. Допускается два типа к поставке: с зеленью или без зелени (одни мясистые черешки). В случае поставки с зеленью - зелень должна быть полностью отросшей, без повреждений и дефектов окраски, утолщающих товарный вид. У самоотбеливающегося типа сельдерея окраска черешков должна быть белой, желтовато-белой или зеленовато-белой, по меньшей мере на ¼ их длины. У зеленого сельдерея – цвет черешков от светло-зеленого по всей длине.



Допустимые отклонения для 1 категории			
Легкие ушибы	Могут допускаться только легкие дефекты, не более 10 мм длиной; цветочный побег до 1/3 длины		Вторично проросший
			
Механические повреждения черешков (одного или двух)	Наличие не более 1 отломанного черешка (лом в брак, оставшаяся часть в качестве)		
			

Нестандарт				
Механические повреждения 3 и более черешков	Сухие кончики черешков > 1 черешка	высоко подрезанный сельдерей, распадающийся на части	Увядание	Прорастание боковых побегов
				

Брак				
Листья, пораженные заболеваниями	Загнив розетки	Подморозка	Загнив черешков.	Обломки черешков
				

Основные инфекционные заболевания и физиологические дефекты	
Внешний вид заболевания	Описание
	Поражаются главным образом старые растения. Перезаражение при хранении возможно. Переборка относительно эффективна. Необходима реализация в течение 2-3 дней. Критичная температура >2,0°С
	Белая гниль Болезнь быстро прогрессирует. Поражаются главным образом старые растения. Перезаражение при хранении возможно. Переборка не эффективна. Критичная температура >4,0°С
	Мокрая бактериальная гниль Поражаются главным образом старые растения. Перезаражение при хранении возможно. Переборка относительно эффективна. Необходима реализация в течение 2-3 дней. Критичная температура >2,0°С
	Серая гниль Заражение происходит еще в поле. Перезаражение возможно. Переборка относительно эффективна. Критичная температура >8,0°С
Коричневая гниль	

 	Заражение происходит еще в поле. Во время хранения перезаражение возможно, но болезнь редко успевает развиваться. При этом возможно проявление заболевания, находившегося в латентном состоянии, на новых растениях. Переборка достаточно эффективна. Критичная температура >8,0°C
Септориоз	
	Физиологическое расстройство. Во время хранения перезаражение не происходит. Переборка эффективна. Критичная температура >10,0°C
Черное сердечко	
	Заражение происходит обычно в поле. Во время хранения перезаражение возможно, но обычно болезнь не успевает развиваться. Переборка эффективна. Критичная температура >8,0°C
Церкоспороз	