

Томаты Черри 0,5кг плк (цена за шт) 1445100076



Дата ввода:
14.01.2019

Допустимый процент некалибра: 5%

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картон пятислойный + требование защитных материалов
-----------------------	---

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ


	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ТИП	Дополнительные требования
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА	картон пятислойный			
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА	коррекс, бумажная панетка			
ПАЛЛЕТЫ	тип (минимальная масса поддона)		РАЗМЕРЫ, мм	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПАЛЛЕТА
	20кг		800 x 1200	1,6м
ОПАЛЕЧИВАНИЕ ПАЛЛЕТ	При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы (стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем ротационного обматывания скрепляющим элементом в 3 слоя по всей высоте товара расположенного на поддоне, с непосредственным его припалечиванием к самому поддону, для исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и выгрузке механизированными средствами, а так же нарушения целостности паллеты. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны. Высота сформированной паллеты не должна превышать 1,6 м., включая защитные уголки. При использовании стретч-пленки опалетка должна вестись «Бабочкой», «крест на крест», чтобы был доступ воздуха через создаваемые окна.			
ФАСОВКА	5 шт; 8 шт; 9 шт; 10 шт; 12 шт			

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ	От +6°C до +10°C
ВНУТРИПЛОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА НА РЦ	От +6°C до +12°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	-0,5°C
ВЫДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНА	высокое


КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДНОРОДНОСТЬ ПАРТИИ	Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только томаты одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера.
КАЛИБР	15-35 мм
ФОРМА, НАЛИЧИЕ ВЕТКИ	томат черри круглой формы, на ветке/без ветки
ЦВЕТНОСТЬ	Для томата черри необходимая степень зрелости по приходу +4 + 5. В индивидуальной упаковке допускается наличие 15% плодов 3 степени зрелости.




Требуемое качество томата

Томаты должны быть свежими целыми, чистыми, здоровыми, плотными, типичной для ботанического сорта формы, не повреждённые с/х вредителями, без чрезмерной поверхностной влажности, без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. В кистях томатов стебли должны быть свежими, здоровыми, чистыми и свободными от всех листьев и без видимых следов посторонних веществ.





допустимые отклонения для 1 категории

незначительные дефекты формы округлого томата	шрам на месте опавшего цветка ≤ 1 см	Опробковение рыльца	пупок	лёгкие поверхностные зарубцевавшиеся повреждения, не более 1 кв.см
				


лёгкие поверхностные пятна, нажимы	незначительные дефекты окраски (цвет может отличаться менее 1 см ²)
	

допустимые отклонения для 2 категория

во 2 категорию относится вся потребительская упаковка, в которой есть 2 и более плодов


пупок более 1 кв.см	рубец на месте опадения цветка > 1 см	зарубцевавшиеся радиальные трещины > 1 см	Солнечный ожог ≤ 1 см ²	Поверхностные зарубцевавшиеся повреждения более 1 кв см, но менее 3 кв.см
				

Дефект формы круглого томата, лимит как на фото



Нестандарт

в нестандарт относится вся потребительская упаковка, в которой есть 2 и более плодов

Поверхностные дефекты более 3 кв.см	Уродующая форма	Поверхностные пятна	Загрязненный	Остатки средств обработки
				

Уродующие пробковые образования	Чрезмерная пустотность кожура плода отступает от мякоти свыше 5 мм	Бактериальная крапчатость, не более 5 точек	примятость	
				

Бронзовитость	Солнечный ожог $>1\text{см}^2$ и $\leq 2\text{см}^2$	Внутреннее опробковение		Водянистость сердцевины
				

Степень зрелости менее 3 и допустимого порога 15 %



Брак

В брак относится вся потребительская упаковка при наличии 1 и более плода с дефектом

Загнившая чашечка	Следы гниения		Перезревший томат. Для оценки необходимо разрезать томат, как на фото. В брак относится перезревший томат, у которого хотя бы одна семенная камера практически растворилась или разрушена (не путать с дефектом произрастания, когда перегородки вообще не было)	
				

Вершинная гниль	Внутренний некроз	Гнилой томат	Томаты с мякотью повреждённой насекомыми
			

Брак

Томаты с мякотью поврежденной насекомыми	Наличие сх-вредителей	Макроспориоз	Черная гниль			
						
Раздавленные/с серьезными механическими повреждениями	Бактериальный рак	Мокрая бактериальная гниль	Свежая трещина	Незарубцевавшаяся трещина		
						
Фитофтороз	Повреждение вредителями	Незарубцевавшийся прокол	Серая головчатая плесень	Антракноз		
						
Некроз вершины плода	Первые симптомы макроспориоза	Серая гниль	Фузариоз	Солнечный ожог >2см²		
						
Повреждение моллюсками	Белая гниль	Недопустимая примятость		Недоразвитая или погибшая плацента		
						
Наличие на стебле/листьях плесени	Потеря тургора/потеря свежести - размяченная мякоть					
						